

ІНДИГО® АГРІКАЛЧЕ

Каталог біологічних препаратів для обробки насіння

ОТРИМАЙ 10% ДОДАТКОВОГО ВРОЖАЮ



С-г культура	Препарат	Мікро організм	Механізм дії
Кукурудза	БІОТРІНСІК i30 ПС 36г/100 кг насіння	<i>Vacillus simplex</i> (Бактерія)	<ul style="list-style-type: none"> Покращення стійкості до посухи завдяки подовженій кореневій системі Покращення засвоєння поживних речовин, особливо важко доступних елементів Збільшення урожаю при формуванні більшої кількості зерен в качанах
	БІОТРІНСІК i30 дуо ПС 36г/100 кг насіння	<i>Vacillus simplex</i> (бактерія) та <i>Coniochaeta nivea</i> (гриб)	<ul style="list-style-type: none"> Покращена стійкість до посухи у фазі цвітіння та наливу зерна. Повноцінне запилення Покращене поглинання поживних речовин завдяки гіфам гриба (синтетичні, органічні добрива, Fe, S) Стійкість до холодового стресу на ранніх стадіях розвитку культури Збільшення врожаю зернової та силосної кукурудзи при більш розвиненій кореневій системі
	БІОТРІНСІК X11 ПС 36г/100 кг насіння	<i>Kosakonia cowanii</i> (бактерія)	<ul style="list-style-type: none"> Захищає кукурудзу та сою проти фузаріозу, пітіозу, ризоктонії Виділяються анти грибкові пептиди та ферменти, які зміцнюють природну імунну систему рослини
Соняшник	БІОТРІНСІК i180 ПС 36г/100 кг насіння	<i>Cladosporium tenuissimum</i> (гриб)	<ul style="list-style-type: none"> Збільшення врожаю завдяки стійкості до посухи Покращене засвоєння поживних речовин (N,P,K,S, Fe) гіфами гриба Краще розвинена коренева система, товсті стебла, тургор, повноцінне запилення
Соя	ІНДИГО 30 ВС 1 мл/1 кг насіння	<i>Vacillus simplex</i> (бактерія)	<ul style="list-style-type: none"> Збільшення врожаю при формуванні додаткових бобів на рослині та покращенні стійкості до посухи та теплового стресу Покращене засвоєння поживних речовин



Кандидат с/г наук
Євген Санін

+380 67 329 96 28

Комерційний директор



Микола Кириленко

+380 98 007 85 85

Директор східного регіону



Леонід Штурмаревич

+380 67 555 2501

Директор західного регіону

Продукт може бути доступний не в усіх регіонах. Можуть застосовуватися додаткові умови та обмеження. Широкий діапазон факторів впливає на урожайність і продуктивність препаратів, ваші результати можуть відрізнятися. Indigo не гарантує жодних конкретних результатів.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ПРЕПАРАТІВ БІОТРІНСІК НА ОСНОВІ ВОДНОЇ СУСПЕНЗІЇ (ВС)

СУМІСНІСТЬ ІНДІГО 30 ВС З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ОБРОБКИ НАСІННЯ

- Інокулянти **ІНДІГО 30 ВС** є сумісними з більшістю найбільш поширених засобів для обробки насіння, а саме як інсектицидних так і фунгіцидних протравників. Проте перед застосуванням потрібно **ЗАВЖДИ УЗГОДЖУВАТИ** з представником Indigo сумісність інокулянту Біотрінсік з використовуваним фунгіцидом або інсектицидом.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Перед застосуванням перемішайте мікробіологічний інокулянт **ІНДІГО 30 ВС** до повністю однорідного стану; під час застосування постійно перемішуйте інокулянт.
- У разі необхідності розбавте мікробіологічний інокулянт питною водою 1:1. Перемішуйте протягом достатнього часу, аби отримати однорідну суміш.
- **ЗАСТОСУВАННЯ В СУМІШІ З ПРОТРУЙНИКАМИ**
 - **ІНДІГО 30 ВС** в баковій суміші сумісно з більшістю фунгіцидів для обробки насіння. Баківі суміші слід використовувати **негайно або протягом 8 годин** після перемішування.
 - **ІНДІГО 30 ВС** зберігається на насінні 5 місяців після змішування та повного висихання але за вказаних умов (у прохолодному місці при температурі нижче за 25 °C **без потрапляння прямих сонячних променів**
 - **ІНДІГО 30 ВС** можна змішувати з іншими протруйниками або наносити поверх вже обробленого насіння.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ПРЕПАРАТІВ БІОТРІНСІК НА ОСНОВІ ПОРОШКА СИПУЧОГО (ПС)

- Інокулянти **Біотрінсік®** – це суміш живих мікро організмів (біктерій та грибків) та інертного порошку (тальк).
- Зберігати в сухому, прохолодному місці (нижче 25C) подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла в щільно закритій заводській упаковці. **НЕ** допускайте замерзання.
- Інокулянти **Біотрінсік®** призначені для рівномірного нанесення у вигляді сухого порошку на насіння за вказаними нормами використання.
- Інокулянти **Біотрінсік®** не можна використовувати в баковій суміші або розчиняти в рідині, а потім наносити на насіння.
- Перед застосуванням **ВИДАЛИТИ ПАКЕТИК СЕЛІКОГЕЛЮ З УПАКОВКИ БІОТРІНСІК**
- Препарати наносити вручну на насіння мірним дозатором, або за допомогою електричного дозатора під час завантаження насіння в бункер сівалки (використовуючи захисну маску та рукавички)
- **ОБРОБЛЕНЕ НАСІННЯ НЕ ЗМІНИТЬ СВІЙ ПОЧАТКОВИЙ КОЛІР.**
- Проконсультуйтеся з менеджерами Індіго по сумісності **Біотрінсік®** з іншими протруйниками
- Норма обробки **Біотрінсік®** сипучих порошоків вказана на кожній упаковці з конкретними нормами в залежності від препарату та культури.
- Очистіть контейнер для обробки водою або лужним миючим засобом.
- Мікробний інокулянт можна утилізувати шляхом стерилізації, автоклавуванням або обробити відбілювачем